

Vedolizumab (Entyvio®)

bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Over Alrijne Zorggroep

Het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn) zijn sinds 1 januari 2015 gefuseerd. Samen vormen zij Alrijne Zorggroep.

Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Samen met u beslissen we over uw behandeling. We passen onze behandelwijze aan, aan uw wensen en behoeften. Hiervoor werken wij samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg én met specialisten in academische ziekenhuizen.

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

www.alrijnezorggroep.nl

Uw behandelend arts en/of uw maag-, darm-, lever (MDL) verpleegkundig specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Vedolizumab (Entyvio®). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze informatie is géén vervanging van de bijsluiter.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundig specialist terecht.

Behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van het maag-darmkanaal; colitis ulcerosa is een ontstekingsziekte van de dikke darm.

Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en van colitis ulcerosa niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. De ziektes genezen niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van, of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Werkning van vedolizumab

Vedolizumab behoort tot een groep van biologische geneesmiddelen die monoklonale antilichamen (MAb's) worden genoemd. Vedolizumab blokkeert een eiwit op het oppervlak van witte bloedcellen die de ontsteking veroorzaken bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, en daardoor wordt de omvang van de ontsteking verminderd.

Vedolizumab wordt gebruikt om de klachten en symptomen bij volwassenen te behandelen van:

- matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa
- matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is vedolizumab. Elke injectieflacon bevat 300 mg vedolizumab.

De andere stoffen in dit middel zijn L-histidine, L-histidinemonohydrochloride, L-argininehydrochloride, sucrose en polysorbaat 80.

Toediening van vedolizumab bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa heeft, zult u eerst andere geneesmiddelen krijgen. Als u niet goed genoeg reageert op deze geneesmiddelen of ze niet kunt verdragen, is het mogelijk dat uw arts u vedolizumab geeft om de klachten en symptomen van uw ziekte te verminderen.

Hoe wordt Vedolizumab toegediend?

De vedolizumab oplossing zal in het ziekenhuis worden toegediend.

Vedolizumab wordt via een intraveneus infuus toegediend in één van uw aderen (meestal in uw arm). Dit wordt ook wel een druppelinfuus genoemd.

De infusie duurt 30 minuten.

Na de eerste twee infusies blijft u tot twee uur na de infusie onder controle in het ziekenhuis. Dit kan bij de volgende infusies worden beperkt tot één uur na infusie.

Waarschijnlijk voelt u een klein prikje van de naald bij het inbrengen van het infuus, verder is de infusie vrijwel pijnloos.

Wanneer u zich niet prettig voelt tijdens de infusie, is het belangrijk dat u dit meldt aan een verpleegkundige of een arts.

Dosis en frequentie

De behandeling met vedolizumab is voor colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn hetzelfde.

De aanbevolen dosering is 300 mg vedolizumab; standaard wordt onderstaande frequentie toegepast:

Tijdstip van behandeling (infusie)

Behandeling 1:	0 weken
Behandeling 2:	2 weken na behandeling 1
Behandeling 3:	6 weken na behandeling 1
Verdere behandelingen	om de 8 weken

Het is mogelijk dat uw arts beslist dit behandelingschema te veranderen, afhankelijk van hoe goed vedolizumab voor u werkt.

Van de patiënten bij wie de behandeling aanslaat, reageert een groot aantal binnen zes weken. Als u de ziekte van Crohn heeft en na zes weken nog niet op de behandeling met vedolizumab heeft gereageerd, kan uw arts overwegen om na 10 weken een extra dosis toe te dienen.

Als u colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn heeft en bij u de vedolizumab minder goed gaat werken, kan uw arts besluiten om het middel vaker toe te dienen, namelijk om de vier weken. Wanneer u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.

Wat moet uw arts of verpleegkundige weten, voor én tijdens de toediening van vedolizumab?

Voordat u vedolizumab –infusie krijgt én tijdens de periode van toediening is het belangrijk dat u uw behandelend arts of verpleegkundige inlicht over uw medische aandoeningen. Informeer hen als u:

- een infectie heeft, of denkt dat u een infectie heeft; als u last krijgt van koude rillingen, beven, aanhoudend hoesten of een hoge koorts.
- klachten heeft die horen bij een allergische reactie of een andere reactie op de infusie, zoals piepende ademhaling, ademhalingsproblemen, galbulten, jeuk, zwelling of duizeligheid. Deze kunnen optreden tijdens of na de infusie.
- een vaccinatie gaat krijgen of kort geleden een vaccinatie heeft gehad. Vedolizumab kan invloed hebben op de manier waarop u op een vaccinatie reageert.
- leverproblemen heeft.
- last krijgt van wazig zien, verlies van gezichtsvermogen of dubbel zien, problemen met praten, zwakte in een arm of been, een verandering in de manier waarop u loopt of problemen met uw

evenwicht, aanhoudend doof gevoel, verminderd gevoel of verlies van gevoel, geheugenverlies of verwardheid.

- kanker heeft. Uw arts zal moeten beslissen of de toediening van vedolizumab kan doorgaan.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast vedolizumab nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen?

Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, kan dit geneesmiddel niet bij u worden toegediend.

Zwanger

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat de behandeling met vedolizumab wordt gestart.

De effecten van vedolizumab bij zwangere vrouwen zijn niet bekend. Daarom wordt dit geneesmiddel niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap, tenzij u en uw arts beslissen dat het voordeel voor u duidelijk opweegt tegen het mogelijke risico voor uzelf en uw baby.

Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, wordt u aangeraden om een zwangerschap te voorkomen terwijl u vedolizumab gebruikt. U moet doeltreffende anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en tot minstens 4,5 maanden na de laatste behandeling.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of als u borstvoeding wilt geven. Het is niet bekend of vedolizumab in de moedermelk terechtkomt en als dat het geval is, welk effect dit kan hebben op uw baby.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Vedolizumab wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of jongeren (tot 18 jaar), omdat er geen informatie is over het gebruik van dit geneesmiddel bij deze leeftijdsgroep.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan een geringe invloed hebben op uw rijvaardigheid of op het gebruik van gereedschap of machines. Een klein aantal patiënten voelde zich duizelig na toediening van vedolizumab. Als u zich duizelig voelt, mag u geen voertuig besturen en geen gereedschap of machines gebruiken.

Bent u de infusie van dit middel vergeten of heeft u het overgeslagen?

Als u een afspraak voor toediening van de infusie bent vergeten of heeft overgeslagen, maak dan zo snel mogelijk een andere afspraak.

Stoppen met het gebruik van dit middel

U mag het gebruik van vedolizumab niet stopzetten zonder dit eerst met uw behandelend arts te bespreken.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen van behandeling met vedolizumab zijn verkoudheid (nasofaryngitis), hoofdpijn en gewrichtspijn.

Tot de mogelijke ernstige bijwerkingen van een behandeling met vedolizumab behoren reacties op de infusie zelf of allergische reacties en infecties.

Informeer onmiddellijk uw arts als u last krijgt van een of meer van de volgende symptomen: piepende ademhaling of problemen met ademen, galbulten, jeukende huid, zwelling, snelle hartslag, misselijkheid, spierkrampen, spierzwakte, prikkelend of tintelend gevoel, pijn op de infusieplaats, roodheid van de huid, (koude) rillingen, hoge koorts (boven de 38,5 graden) of huiduitslag.

Vragen

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw MDL verpleegkundig specialist, of uw behandelend MDL specialist.

U kunt de MDL verpleegkundig specialist bereiken via de polikliniek interne geneeskunde/ maag-, darm-, leverziekten.

- De polikliniek interne geneeskunde Alrijne ziekenhuis Leiderdorp heeft bestemmingsnummer 115 en is telefonisch te bereiken via 071 582 8050.
- De polikliniek interne geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft bestemmingsnummer 34 en is telefonisch te bereiken via 0172 467 050.
- De polikliniek interne geneeskunde in Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 41 en is telefonisch te bereiken via 071 517 8308.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen.

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de balie van de afdeling/polikliniek.

Geef uw mening!

Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u aangeven hoe u de zorg in Alrijne Ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunt u ons helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.