

Gynaecologie

# Een baarmoederfoto

Hysterosalpingogram (HSG)

## Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

**Alrijne Ziekenhuis Leiden**  
Houtlaan 55  
2334 CK Leiden  
071 517 8178

**Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp**  
Simon Smitweg 1  
2353 GA Leiderdorp  
071 582 8282

**Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn**  
Meteoorlaan 4  
2402 WC Alphen aan den Rijn  
0172 467 467

**Uw behandelend arts heeft voor u een HSG (hysterosalpingogram, baarmoederfoto) aangevraagd bij de afdeling Radiologie. In deze folder geven wij u hierover meer informatie.**

## Doel van het onderzoek

Een HSG maakt onderdeel uit van het vruchtbaarheidsonderzoek. Bij een HSG wordt met behulp van contrastvloeistof de binnenkant van de baarmoeder en de eileiders zichtbaar. Op de foto is te zien of de baarmoeder en de eileiders er normaal uitzien en of de eileiders goed toegankelijk en doorgankelijk zijn. Dit is nodig voor een zaadcel om een eicel te bevruchten. Om spontaan zwanger te kunnen worden moet minstens 1 eileider open zijn.

Dit onderzoek heeft bovendien een extra effect: de kans op zwangerschap na het onderzoek wordt iets groter.

## Belangrijk

Het onderzoek vindt bij voorkeur direct na de menstruatie plaats. Op deze manier is het zeker dat u niet zwanger bent tijdens het onderzoek. Bij het doorspuiten met contrast kan de ontwikkeling van een jonge zwangerschap namelijk verstoord worden.

De menstruatie moet wel helemaal over zijn.

De polikliniek-assistente kan met u afspreken te bellen als de menstruatie begint. Dan is het eenvoudig het onderzoek op een veilig moment te plannen.

## Vorbereiding

- Twee uur voor het onderzoek kunt u pijnstilling innemen. Geadviseerd wordt Paracetamol 1000 mg of Ibuprofen 600 mg of Naproxen (Aleve) 500 mg of Diclofenac (Voltaren) 25-50 mg. Deze zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheker (zonder recept).
- Tijdens het onderzoek kan jodium worden gebruikt. Als u overgevoelig bent voor jodium, is het belangrijk dat u dit van tevoren aan de arts meldt.
- Het is niet verstandig om na het onderzoek zelf als bestuurder deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom tevoren dat iemand u na het onderzoek komt ophalen.

## Melden

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de afdeling Radiologie.

- Gaat u naar Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, volg dan routenummer 173.
- Gaat u naar Alrijne Ziekenhuis Leiden, volg dan routenummer 36.

Neem uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringpas mee. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte tot een radiologie laborant u komt ophalen.

## Het onderzoek

Bij het onderzoek zijn een gynaecoloog en een radiologie laborant aanwezig. Dit zal niet altijd uw behandelend gynaecoloog zijn.

U dient het onderlichaam te ontkleden. Dan neemt u plaats op een gynaecologische stoel. Hierboven hangt een röntgenapparaat. Met een speculum (eendenbek) wordt de baarmoedermond zichtbaar gemaakt.

Vervolgens wordt in de baarmoedermond een slangetje geplaatst. Aan het uiteinde van het slangetje zit een ballonnetje wat na plaatsing wordt gevuld met wat vocht zodat het slangetje op zijn plaats blijft. De meeste vrouwen ervaren het vullen van het ballonnetje met vocht als menstruatiepijn. Een andere methode is het plaatsen van een cupje op de baarmoedermond, waarmee contrastvloeistof wordt ingespoten. De contrastvloeistof is nodig om de baarmoeder en eileiders zichtbaar te maken. De meeste vrouwen ervaren dit als onplezierig of pijnlijk. De contrastvloeistof vloeit vervolgens van de baarmoeder via de eileiders naar de vrije buikholte. Ondertussen worden er röntgenfoto's gemaakt. Hierop is te zien of er een vrije doorgang is tussen de baarmoeder en de eileiders. Als de vloeistof hierna de vrije buikholte invloeit, is een blokkade in de eileiders, als oorzaak van eventuele onvruchtbaarheid, uitgesloten.

De pijn verdwijnt snel na het onderzoek. Het kan zijn dat u zich na het onderzoek niet zo fit voelt.

## Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt niet langer dan vijftien minuten.

## Weer naar huis

Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Wij adviseren u niet zelf aan het verkeer deel te nemen, maar u naar huis te laten brengen.

## Uitslag

Uw gynaecoloog kan u vaak direct na het onderzoek al iets over de uitslag vertellen. De definitieve uitslag en de vervolgstappen in diagnostiek of behandeling, worden besproken tijdens een vervolgspraak op de polikliniek.

## Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u na het onderzoek tijdelijk wat afscheiding heeft. Dit is onder andere het gevolg van het teruglopen van de vloeistof. Ook is het mogelijk dat u na het onderzoek 1 tot 2 dagen last heeft van lichte pijn in de onderbuik, die vergelijkbaar is met een menstruatiergevoel. Dit verdwijnt vanzelf. Indien nodig, mag u hiervoor paracetamol voor gebruiken.

## Contact opnemen

U moet contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie:

- als binnen een week na het onderzoek een hevige nabloeding optreedt;
- als u binnen een week na het onderzoek weer pijn in de onderbuik en/of koorts krijgt.

Buiten de openingstijden van de polikliniek en in het weekeinde kunt u bellen met de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, 071 582 8905.

## Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

## Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de gynaecoloog.

Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

## Telefoonnummers

Telefonisch zijn wij te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur via 071 582 8240 of 071 582 8048 (locatie Leiderdorp en Alphen) en via 071 517 8351 (locatie Leiden).

Buiten de openingstijden van de polikliniek en in het weekeinde kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) locatie Leiderdorp, 071 582 8905.

## Routenummers

De polikliniek Gynaecologie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 35.

De polikliniek Gynaecologie locatie Leiden heeft routenummer 16.

De polikliniek Gynaecologie locatie Leiderdorp heeft routenummer 43.

## Over Alrijne Zorggroep

Op onze locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim, bieden wij de beste zorg dichtbij aan iedere patiënt. En dat doen we samen: met patiënten die de regie over hun eigen leven voeren, met deskundige en betrokken medewerkers, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie over Alrijne Zorggroep kunt u terecht op [www.alrijne.nl](http://www.alrijne.nl).

Volg ons ook op Twitter @alrijne en Facebook.

## Geef uw mening!

Op [www.zorgkaartnederland.nl](http://www.zorgkaartnederland.nl) kunt u aangeven hoe u de zorg in Alrijne Ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunt u ons helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.