

Gynaecologie

Behandeling van de baarmoedermond m.b.v. lisexcisie of conisatie

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Uit onderzoek (uitstrijkjes en/of eventueel kolposcopie met weefselonderzoek) is gebleken dat de baarmoedermond afwijkend weefsel bevat. Het doel van de ingreep is om het afwijkende weefsel te verwijderen.

De ingreep

Lisexcisie

Met behulp van een metalen lisje wordt het oppervlakkige weefsel van de baarmoedermond weggesneden. Dit weefsel wordt ook microscopisch onderzocht.

De ingreep wordt in principe door uw eigen gynaecoloog uitgevoerd en vindt plaats op de polikliniek Gynaecologie. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten. U kunt na de behandeling gewoon naar huis.

U ligt op de onderzoekstoel in de beensteunen. U krijgt een pleister op het been om de stroom te geleiden (het lisje snijdt elektrisch). Er wordt een speculum ingebracht. De baarmoedermond wordt plaatselijk verdoofd met een injectie. Als bijwerking hiervan kunt u hartkloppingen krijgen die na enkele minuten weer wegtrekken. Wanneer het weefsel is weggesneden wordt de wond dichtgeschroeid om nabloeden te voorkomen. Door de verdoving is de ingreep in principe niet of nauwelijks pijnlijk.

Conisatie

In het geval dat er een conisatie is afgesproken, gebeurt dat op de operatiekamer onder verdoving. Er wordt dan ofwel met een mes, ofwel met een elektrisch puntje, een kegelvormig stuk uit de baarmoedermond gesneden. Meestal kunt u ook dan dezelfde dag naar huis. Wij adviseren u om niet alleen naar huis te gaan. Regel iemand die u naar huis kunt brengen.

Na de ingreep

U krijgt vrijwel geen pijn na deze behandeling. Wel kunt u de eerste paar dagen bloedverlies hebben. Wanneer dit meer is dan een normale menstruatie, moet u contact opnemen met de polikliniek. U zult een aantal dagen tot twee weken veel waterige en soms sterk ruikende afscheiding krijgen. Hiervoor mag u geen tampons gebruiken.

Ook seksueel contact en zwemmen wordt afgeraden gedurende de eerste twee weken na de ingreep. U mag wel douchen.

Controle

Na 1 week hoort u de uitslag van het weefselonderzoek. U hoort dan ook of er nog speciale maatregelen nodig zijn.

Na een conisatie komt u na enkele weken op de polikliniek terug voor een controleafspraak. Het vervolgonderzoek bestaat meestal uit een uitstrijkje: 6, 12 en 24 maanden na de ingreep.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie, dan kunt u die altijd stellen aan de gynaecoloog of de polikliniekassistent.

Complicaties

Bij complicaties, zoals toenemende pijn, koorts of toenemend bloedverlies, moet u contact opnemen met de dienstdoende gynaecoloog.

Binnen kantooruren:

Polikliniek Gynaecologie locatie Leiden: 071 517 8351

Polikliniek Gynaecologie locatie Leiderdorp: 071 582 8048

Polikliniek Gynaecologie locatie Alphen aan de Rijn: 0172 467 048

Buiten kantooruren:

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantooruren telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Over Alrijne Zorggroep

Op onze locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim, bieden wij de beste zorg dichtbij aan iedere patiënt. En dat doen we samen: met patiënten die de regie over hun eigen leven voeren, met deskundige en betrokken medewerkers, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie over Alrijne Zorggroep kunt u terecht op www.alrijne.nl.

Volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook.

Geef uw mening!

Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u aangeven hoe u de zorg in Alrijne Ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunt u ons helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.