

Longziekten

Histamineprovocatietest

MEDICATIE VOOR DEZE TEST ALTIJD STOPPEN! (zie volgende pagina)

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Stakingsvoorschrift medicatie bij de histamineprouocatietest

1 week van tevoren stoppen met: Anoro Incruse Ellipta Seebri Spiriva Spiolto Totrus Zonda Ultibro
72 uur van tevoren stoppen met: Aerius Allerfre Claritine Mizollen Promethazine Tavegyl Telfast Tinset Xyzal Zyrtec
48 uur van tevoren stoppen met: Daxas Onbrez Relvar Ellipta Striverdi Theolair retard
36 uur van tevoren stoppen met: AirFluSal Forspiro Aerivo Atimos (=Formoterol) Bufoler Easyhaler Busalair Duaklir genuair DuoResp Spiromax Elpenhaler Eklira Genuair Flutiform Foradil (=Formoterol) Foster Oxis (=Formoterol) Seretide Serevent Symbicort Singulair Semprex
12 uur van tevoren stoppen met: Atrovent (= Ipratropium) Berodural Combivent
6 uur van tevoren stoppen met: Airomir Bricanyl Ventolin (= Salbutamol)
Het is niet nodig om te stoppen met: Alvesco Flixotide Pulmicort (= Budesonide) Qvar (= Beclometason)

Uw behandelend arts heeft voor u een histamineprovocatietest aangevraagd. In deze folder geven we informatie over dit onderzoek.

Om de test goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw behandelend arts nauwkeurig op en lees deze informatie goed door.

Doel van de test

De histamineprovocatietest is een functieonderzoek om de gevoeligheid van de luchtwegen te bepalen.

Vorbereiding

- U hoeft geen speciale kleding te dragen.
- Zware inspanning dient u ten minste twee uur vóór de test te vermijden.
- U mag vooraf gewoon eten en drinken.

Zorg dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint en zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Vooraf stoppen met uw longmedicijnen!

Het is absoluut noodzakelijk om vóór de histamineprovocatietest op de juiste wijze te stoppen met het innemen van uw longmedicatie. De voorschriften hiervoor zijn per medicijn verschillend. Kijk voor de voorschriften over uw medicatie op het [schema op pagina 2](#).

Let op: Bent u niet op tijd gestopt met uw longmedicatie dan kan de test niet doorgaan.

Alle overige medicatie die u gebruikt, kunt u gewoon nemen. Staat uw longmedicatie niet op de stakingslijst, neemt u dan contact op met de longfunctieanalist over wel of niet door gebruiken.

Afspraak

Wij verwachten u op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd in:

- Alrijne Ziekenhuis Leiden (route 45). U hoeft zich niet te melden, u kunt plaatsnemen in de wachtkamer.
- Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (route 107). U meldt zich bij de balie van de polikliniek Longziekten.

De test

Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstukje in uw mond dat verbonden is met meetapparatuur. Ook krijgt u een klemmetje op de neus om ervoor te zorgen dat u door de mond ademt.

Wij vragen u om heel diep in te ademen en heel hard uit te blazen. Hierna ademt u een vernevelde uloeistof (histamine) in via een tweede mondstuk.

Na het inademen wordt u weer gevraagd heel diep in te ademen en heel hard uit te blazen.

Vervolgens wordt het inademen van de histamine een aantal keren herhaald, in een steeds hogere concentratie.

De test stopt als alle concentraties zijn ingeademd of eerder als u minder hard kunt uitblazen en er een daling is van 20% op de hoeveelheid lucht die u hard uitblaast. Door deze daling kunt u kortademig worden. Dit wordt door toediening van medicatie weer verholpen. Het kan zijn dat u tijdens dit

onderzoek meer gaat hoesten, als het harde uitblazen niet minder wordt, gaat het onderzoek gewoon door.

Duur van de test

De test duurt ongeveer 60 minuten.

Hoe wordt het onderzoek ervaren?

De histamineprovocatietest is pijnloos, wel kunt u lichte klachten van kortademigheid krijgen, of wat meer gaan hoesten.

Uitslag

Heeft u na de histamineprovocatietest een afspraak bij uw behandelend arts, dan zal deze de uitslag met u bespreken.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan gerust aan de longfunctieanalist,

- Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 8329.
- Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Alphen aan den Rijn: telefoonnummer 071 582 8734.

Heeft u nog vragen over uw afspraak of wilt u deze verzetten, belt u dan het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 55 43, of de polikliniek Longziekten:

- Alrijne Ziekenhuis Leiden: van maandag tot en met vrijdag 071 517 8470 tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 tot 16.30 uur.
- Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Alphen aan de Rijn: maandag tot en met vrijdag 071 582 8053 tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 tot 16.30 uur.

Over Alrijne Zorggroep

Op onze locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim, bieden wij de beste zorg dichtbij aan iedere patiënt. En dat doen we samen: met patiënten die de regie over hun eigen leven voeren, met deskundige en betrokken medewerkers, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie over Alrijne Zorggroep kunt u terecht op www.alrijne.nl.

Volg ons ook op Twitter @alrijne en Facebook.